Ateneo

Clínica Médica B

10/08/2023

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Clínica
Médica
B

Hospital de Clínicas
Facultad de Medicina
UDELAR

Dr. Matias Banega, Residente 3er año- Sanatorio Americano

Dra Camila de Leon, Residente 1er año. COSEM.

Dra. Laura Guerra, Posgrado 1 er año. COMERO

Dra. Romina Caraballo, Residente 4to año. CRAMI.

Caso clínico

Revisión bibliográfica:

- Esclerosis sistémica
- Introducción
- Etiopatogenia
- Manifestaciones clínicas
- Diagnóstico
- Crisis renal esclerodérmica

CASO CLINICO

The logo for CMB, consisting of the letters 'CMB' in a light blue font on a dark blue square background with rounded corners.

Sexo Masculino, 59 años, procedente de Montevideo.

Antecedentes personales :

- Diagnóstico de dermatiomiositis en contexto de Síndrome de Antisintetasa en 2015 al debut compromiso cutáneo, pulmonar acompañado de debilidad muscular. Que requirió tto con bolos de metilrednisolona, con franca mejoría. Tto actual: micofenolato de mofetilo 1 gr /día . En controles semestrales en medicina interna.
- Ex Tabaquista, IPA de 5 , no Bronquítico crónico , no disnea.
- Dislipemia, en tratamiento con Ezetimibe 10 mg.
- Inmunización completa.

CASO CLINICO

The logo for CMB, consisting of the letters 'CMB' in a bold, sans-serif font, with a small white comma-like shape to the right of the 'B'. The logo is white and is set against a dark blue square background with rounded corners.

ENFERMEDAD ACTUAL:

- Disnea de esfuerzo, CF IV , rapidamente progresiva, de 48 h de evolucion.
- Cefalea intensa, holo craneana , tipo pulsatil.
- Sin fiebre

De la valoración se constata Hipertensión 230-150 ,

- Insuficiencia cardiaca (Edema agudo pulmonar)

Emergencia hipertensiva, Hipertensión arterial en fase acelerada (hipertension maligna).

Se realiza valoración y solicita ingreso a CTI.

Paraclinica al ingreso :

- Creatinina 3,7 mg/dl , Azoemia 1,27 (previa del 10/22 1,04 mg/dl) , no acidosis , no disionias.
- Examen de orina, no presentó alteraciones
- Fondo de ojo con elementos de retinopatía hipertensiva GIII-IV (hemorragias en astilla peripapilares y algunos exudados algodinosos)
- Hemograma plaquetopenia 96000/ mm³ , lámina periférica sin esquistocitosis .
- ETT, Ventrículo izquierdo de espesor levemente aumentado , Aurícula izquierda levemente aumentada, FEVI 60%, válvula aórtica fibrocalcificada sin estenosis ni insuficiencia , válvula mitral con insuficiencia leve moderada.

CASO CLINICO

CMB,

CASO CLINICO

CMB

Permanece 24 h en CTI, es valorado por nefrología que comienza terapia sustitución renal.

En su ingreso a sala de medicina interna :

Examen físico:

A nivel de piel,

Fenómeno de Raynaud en ambos miembros superiores

Cicatrices en pulpejos de ambas manos en forma estrellada , lesiones ulceradas "en mordedura de rata" dolorosas sin elementos de sobreinfección.

Mega Capilares, a nivel ungueal con espacios avasculares.

Esclerodactilia , esclerosis de piel que llega a región proximal de metacarpo falángica

A nivel de rostro y parte alta de tronco se evidencian telangiectasias , microstomia.

CV: RR, FC 89 cpm , IY , RHY , edemas simetricos de miembros inferiores.

PP: Eupneico , mav presente bilateral estertores crepitantes a extrema base, saturando 97% con cn a 3 litro minuto.

CASO CLINICO

CMB,

CASO CLINICO

The logo for CMB, consisting of the letters 'CMB' in a bold, sans-serif font, with a small white comma-like shape to the right of the 'B'. The logo is set against a dark blue square background.

Valorado en conjunto con nefrologia e Inmunologia:

Dado que presenta elementos de esclerodermia que comprende esclerodactilia ,raynoud , microstomia , telangiectasias en cara y cara anterior de tórax , se plantea esclerosis sistematica. Crisis renal esclerodemica.

Se completa valoracion para descartar HTA secundaria.

Se completa panel inmunológico , perfil miopatico (Aldolasa, CPK negativa).

Se discute en reiterados ateneos indicación de Puncion biopsica Renal , dado panel inmunológico , clinica se decidió no realizo.

Tratamiento:

Se comienza IECA (Enalapril 20 mg) , se suspende diureticos, con estabilizacion de cifras tensionales

Dada buena evolución no se plantea recambio plasmatico.

HIPERTENSIÓN
ARTERIAL
SECUNDARIA

Renal

Endocrinos

Exógenas

Sin nuevo farmacos, no drogas

Enfermedad
sistémica

Esclerodermia

Vasculorrenal

Ecodoppler renal
normala

Parenquima

Ecografia sin alteraciones
estructurales

Examen de orina
sin alteracion
Urocultivo, E.coli

Hipertiroidismo/
Hipotiroidismo (N)

Catecolaminas y
metanefrinas fraccionadas
en plasma normal

Feocromocitoma

Hiperaldosteronismo
primario

Aldosterona normal

Sincrome de Cushing

Cortisol normal

CASO CLINICO

CMB

Se complementa valoración con panel de anticuerpos;

- ANCA negativo.
- Ac antifosfolipidos (anticardiolipinas y Anti b2glicoproteinas negativos Inhibidor lupico levemente positivo 1,45 (normal 1,20)
- ANA positivo 1/ 320 patron nuclear homogéneo; AC-8 nucleolar homogéneo

Antigenos asociados: PM/Scl-75, PM/Scl 100, Th/To, B23/ nucleofosmina nucleones, No 55/ SC 65.

Que se asocia , Esclerosis Sistémica , ES/ Polimiositis , superposición.

CASO CLINICO

The logo for CMB, consisting of the letters 'CMB' in a light blue, sans-serif font, positioned inside a dark blue rounded square.

En suma :

Crisis hipertensiva en fase acelerada , con paraclínica que aleja hipertensión arterial secundaria típica.

Insuficiencia renal aguda , que requiere terapia de sustitución renal.

Con elementos clínicos de esclerosis limitada con ANA positivo que se asocia a esclerosis sistémica , en conjunto con nefrologías y inmunología se plantea el caso como Crisis renal esclerodérmica.

CASO CLINICO

CMB

Evolucion:

- Requirio Hemodiálisis desde 05/03 al 23/03.
- Franca mejoría de función renal
- Se incorporó a todas actividades de vida diaria.
- Mejoría de lesiones de piel con tratamiento instaurado

REVISIÓN

ESCLEROSIS SISTÉMICA CON
ENFOQUE EN CRISIS
ESCLERODÉRMICA RENAL

SINDROME ANTI SINTETASA

The logo for CMB, consisting of the letters 'CMB' in a light blue font on a dark blue square background with rounded corners.

Inicio relativamente aguda con síntomas constitucionales (fiebre, pérdida de peso), **miositis**, fenómeno de Raynaud , "manos de mecánico", artritis (en general no erosiva) y EPI.

El 30% tendrán erupciones cutáneas típicas de Dermatomiositis

No todos los pacientes con ac. anti sintetasa tienen todas las manifestaciones del síndrome
Ac. contra una de las enzimas aminoacil-transferasa (tRNA) sintetada, más contundente
Histidil-tRNA sintetasa (Jo1)

DERMATOMIOSITIS

CMB

Miopatías inflamatorias idiopáticas o miositis idiopáticas que afecta musculo esquelético y la piel.
Comprende a un grupo heterogéneo de enfermedades musculares de etiología desconocida.

Se caracteriza por:

Aparición progresiva de debilidad muscular e inflamación.

Lesiones dermatológicas características.

El 20 -80 % presentan enfermedad pulmonar intersticial.

DERMATOMIOSITIS

Lesiones dermatológicas características.

- Pápulas de Gottron; pápulas eritematosas a violáceas, simétricas que aparece en la prominencia óseas ; principalmente en cara externa de la articulaciones metacarpo-falángicas e interfalángicas .
- Generalmente tienen escamas asociadas y pueden ulcerarse .
- Pueden simular a psoriasis o linquen plano.

DERMATOMIOSITIS

Lesiones dermatológicas características.

- Erupción en Heliotropo: erupción eritematosa a violáceas en la piel prioritaria , a veces acompañada de edema palpebral
- Eritema facial : similar a eritema malar de la LES pero comprende los pliegues nasolabiales

DERMATOMIOSITIS

Lesiones dermatológicas características.

- Poiquilodermia fotodistribuida: sitios fotoexpuestos; parte superior de la espalda, (signos del chal) y de la V del cuello y la parte superior del pecho) , sepuede asociar a prurito , el eritema puede ser mácula o papular.
- Signo de la funda , puede presentar poiquilodermia en cara lateral de los muslos.

Imagenes Tomadas de :<https://www.lecturio.com/es/concepts/dermatomyositis/>

ESCLEROSIS SISTEMICA

CMB,

La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad autoinmune crónica, que se caracteriza por una importante heterogeneidad clínica y va asociada a una alta morbilidad y a la mayor tasa de mortalidad específica de todas las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo.

ENFERMEDAD RARA

1/10.000

0,6-122/1.000.000

9:1

30-50 AÑOS

GENETICO

- Mayor concordancia monocigótica en gemelos
- Genes relacionado con HLA
- Genes no relacionados con HLA: **TNFAIP3**, **CD247**, **IRF5**, **STAT4**, y **PTPN22**

AMBIENTAL

- Exposición a químicos: Quimioterapia (taxane y gemcitabine), gadolinio y radioterapia
- Disolventes orgánicos
- Implante mamario de silicona
- Infecciones

ESCLEROSIS SISTEMICA

La fisiopatología se basa en un proceso auto-amplificado que primero implica el daño microvascular, seguido por una respuesta autoinmune-inflamatoria y fibrosis difusa

ESCLEROSIS SISTEMICA

CMB,

CAUSA DESCONOCIDA

DAÑO INICIAL A NIVEL ENDOTELIAL

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA INMUNE

AUTOANTICUERPOS Y MEDIADORES INFLAMATORIOS

ACTIVACIÓN DE FIBROBLASTOS: FORMACION DE MEC

DEPÓSITO DE COLÁGENO EN ÓRGANOS

ESCLEROSIS SISTEMICA

MANIFESTACIONES CLINICAS

- Cutaneas
- Vasculares
- Musculoesqueleticas
- Pleuropulmonares
- Renales
- Cardiacas
- Digestivas
- Neurologias
- Hematologicas

ESCLEROSIS SISTEMICA

CMB

Según la extensión del compromiso cutáneo se puede clasificar a la enfermedad en:

<i>Clasificación de la Esclerodermia⁽³⁾</i>
1. Localizada Morfea Morfea generalizada Lineal
2. Esclerosis sistémica Limitada Difusa Esclerosis sistémica sin esclerodermia
3. Síndromes esclerodermiformes Inducidos por tóxicos Metabólicos Inmunológicos

Cuadro 1

<i>Síndromes esclerodermiformes</i>	
Agentes	Manifestaciones clínicas
Fármacos	
Bleomicina Metisergida Pentazocina	Fibrosis pulmonar Fibrosis retroperitoneal Hiperpigmentación, miopatía simétrica
Otras sustancias	
Cocaína Silicona Parafina	Esclerodactilia Esclerosis cutánea, F. de Raynaud Esclerosis cutánea
Solventes orgánicos	
Cloruro de vinilo	Morfea, Raynaud, Acroesclerosis
Agentes inorgánicos	
Sílice	Fibrosis pulmonar, esclerosis cutánea
Otros	
Vibración	Raynaud, esclerodactilia

Cuadro 2

Octubre 2008 • en Medicina [Internet]. [cited 2023 Aug 9]. Available from:

http://clinicamedica1.com.uy/wp-content/uploads/2016/05/Esclerosis_sistemica.pdf

ESCLEROSIS SISTEMICA

CMB

Panel 2: Typical features of the major subsets of systemic sclerosis

Limited cutaneous systemic sclerosis

- Distal skin sclerosis
- Long history of Raynaud's phenomenon
- Late-stage complications frequent
- Pulmonary arterial hypertension and severe gut disease frequent and serious

Diffuse cutaneous systemic sclerosis

- Proximal limb or trunk involvement, with skin sclerosis
- Short history of Raynaud's phenomenon
- Increased risk of renal crisis and cardiac involvement
- High frequency of severe lung fibrosis

Sine scleroderma

- Raynaud's phenomenon
- Typical systemic sclerosis serology or capillaroscopic features
- No skin thickening
- Organ-based or other vascular manifestations

Systemic sclerosis overlap syndrome

- One of the three subsets together with clinical and investigational features of another autoimmune rheumatic disease

Denton C, Khanna D. Systemic sclerosis. *The Lancet*. 2017;390(10103), 1685–1699.

ESCLEROSIS SISTEMICA

MANIFESTACIONES CUTANEA

CMB

- Esclerodactilia
- Acrosclerosis
- Hiper e hipo pigmentación

Esclerodactilia: dedos en garra

Figura 1

Microstomía

ESCLEROSIS SISTEMICA

MANIFESTACIONES VASCULARES

CMB

- Fenomeno de raynaud
- Telangectasias
- Ulcera puntiforme en punta de los dedos

Fenómeno de Raynaud

1) Fase pálida	2) Fase cianótica	3) Fase hiperémica
Isquemia por vasoconstricción	Hipoxia tisular	Hiperemia por vasodilatación

3 fases 45%		
2 fases 55% (92% con fase pálida)		

ESCLEROSIS SISTEMICA

- Musculoesqueleticas: debilidad muscular, artralgias y artritis.
- Digestivas: fibrosis de la musculatura lisa intestinal, reflujo gastroesofágico, esofagitis o esófago de Barrett
- Respiratorias: HAP/EPID

Figure 4: Overview of major complications of systemic sclerosis

Clinical and pathological or radiological features of the key organ-based complications of systemic sclerosis. Digital vasculopathy can lead to ulceration, gangrene, and amputation in severe cases. Lung fibrosis might have a usual interstitial pneumonia pattern or, more often, a non-specific interstitial pneumonia pattern. Pulmonary hypertension might be identified by enlargement of the pulmonary arterial trunk relative to the aorta and, if lung fibrosis is absent, is more likely to reflect pulmonary arterial hypertension. (A) Digital ulceration. (B) Dry gangrene. (C) Autoamputation. (D) Intestinal pseudo-obstruction. (E) Gastric antral vascular ectasia. (F) Lung fibrosis with a usual interstitial pneumonia appearance on high-resolution chest CT. (G) Lung fibrosis with a non-specific interstitial pneumonia appearance on high-resolution chest CT. (H) Pulmonary arterial hypertension shown histologically. (I) Pulmonary arterial hypertension shown on CT. (J) Cardiac fibrosis. (K) Scleroderma renal crisis. (L) Digital contractures. (M) Calcinosis. (N) Acro-osteolysis.

ESCLEROSIS SISTEMICA CLASIFICACIÓN

CMB,

Criterios diagnósticos del ACR

Criterios mayores:

Esclerodermia proximal a las articulaciones metacarpo-falángicas en manos o metatarso-falángicas en pies.

Criterios menores:

Esclerodactilia
Cicatrices digitales puntiformes
Fibrosis pulmonar bibasal

Cuadro 3

1. PRESENCIA DE ESCLERODERMIA PROXIMAL

2. presencia de 2 de los 3 criterios menores

20/30 % DE LOS PACIENTES NO CUMPLIAN LA

Panel 1: Summary items from the 2013 American College of Rheumatology and European League Against Rheumatism criteria for the classification of systemic sclerosis*

Proximal skin involvement

- Skin thickening of the fingers of both hands, extending proximal to the metacarpophalangeal joints (sufficient criterion; score 9)

Skin thickening of the fingers (only count the higher score)

- Puffy fingers (score 2)
- Sclerodactyly of the fingers (distal to the metacarpophalangeal joints but proximal to the proximal interphalangeal joints; score 4)

Fingertip lesions (only count the higher score)

- Digital tip ulcers (score 2)
- Fingertip pitting scars (score 3)

Telangiectasia (score 2)

Abnormal nailfold capillaries (score 2)

Pulmonary arterial hypertension or interstitial lung disease (maximum score of 2)

- Pulmonary arterial hypertension (score 2)
- Interstitial lung disease (score 2)

Raynaud's phenomenon (score 3)

Systemic sclerosis-related autoantibodies (maximum score of 3)

- Anti-centromere (score 3)
- Anti-topoisomerase I (score 3)
- Anti-RNA polymerase III (score 3)

*A total score of 9 is needed for a definite classification.

• OCTUBRE 2008 • EN MEDICINA INTERNET]. [CITED 2023 AUG 9]. AVAILABLE FROM:

HTTP://CLINICAMEDICA1.COM.UY/WP-CONTENT/UPLOADS/2016/05/ESCLEROSIS_SISTEMICA.PDF

• DENTON C, KHANNA D. SYSTEMIC SCLEROSIS. THE LANCET. 2017;390(10103), 1685–1699.

ESCLEROSIS SISTEMICA DIAGNOSTICO

CMB

CLINICO-PARACLINICO

- ➔ **ANA:** POSITIVOS EN 90% DE LOS CASOS. INTERESA PATRÓN MOTEADO
- ➔ **ANTI CENTROMERO:** ASOCIADOS CON ESCLEROSIS SISTÉMICA LIMITADA E HAP
- ➔ **ANTI-SCL-70:** ASOCIADOS CON ESCLEROSIS SISTÉMICA DIFUSA Y FIBROSIS PULMONAR
- ➔ **ANTI-RNA POLYMERASE III:** ASOCIADOS CON ESCLEROSIS SISTÉMICA DIFUSA Y CRISIS RENAL
- ➔ **U3 RNP:** ES difusa, asociada con EPID
U1 RNP: miopatía, afectación articular, HTAP
Th/To: ES limitada
PM SCL: miopatía, afectación articular

ESCLEROSIS SISTEMICA CAPILAROSCOPIA

CMB

Genetic and environmental endogenous/exogenous risk factors, epigenetic mechanisms	Very Early microvascular morphological markers	Early microvascular morphological markers, very early fibrotic reaction, presence of serum autoantibodies	Increased microvascular morphological markers, specific autoantibodies, evident tissue fibrosis	Advanced microvascular morphological changes, increased tissue/organs fibrosis and specific autoantibodies	Microvascular failure and marked diffuse tissue/organs fibrosis with necrosis/failure
Normal	VERY EARLY	EARLY*	EARLY-ACTIVE	ACTIVE*	LATE*

Morphological capillaroscopic validated patterns *of progressive microvascular and tissue damage in systemic sclerosis corresponding to the pathophysiology					

CUTOLO M, SOLDANO S, SMITH V. PATHOPHYSIOLOGY OF SYSTEMIC SCLEROSIS: CURRENT UNDERSTANDING AND NEW INSIGHTS. EXPERT REVIEW OF CLINICAL IMMUNOLOGY. 2019 MAY 13;15(7):753–64.

ESCLEROSIS SISTEMICA

Los planes de gestión iniciales deben Considerar

- Clasificación de la esclerosis sistémica
- Duración de la enfermedad
- La presencia característica superpuesta de enfermedad del tejido conectivo

Figure 2: Investigation strategy for systemic sclerosis

ESCLEROSIS SISTEMICA

Denton C, Khanna D. Systemic sclerosis. The Lancet.

2017;390(10103), 1685–1699.

CRISIS RENAL ESCLERODERMIA

CMB,

La crisis renal esclerodérmica es una complicación grave y poco frecuente. Se caracteriza por crisis hipertensiva y falla renal aguda progresiva y ocurre principalmente en los primeros años de la enfermedad

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR CRISIS RENAL ESCLERODÉRMICA.

- Uso previo de glucocorticoides (prednisona 15 mg / día o equivalente)
- Afectación cutánea difusa
- Afectación cutánea rápidamente progresiva
- Anticuerpos anti- ARN polimerasa III
- Aparición de Insuficiencia Cardíaca

CRISIS RENAL ESCLERODERMIA

Paciente con sospecha de crisis renal

Investigar factores de riesgo para crisis renal*
Determinar de forma correcta la presión

Presión arterial normal
(normotenso)

¿Pruebas de función renal normales?

Si

No

Controlar la presión arterial y otras alteraciones de la crisis renal

Mantener en vigilancia la función renal:
A) Cada 6 meses por 5 años en esclerosis sistémica difusa
B) Cada 6 meses por 1 año en la esclerosis sistémica localizada

Hipertensión arterial leve moderada
(TA > 140/90 mm Hg)

Iniciar tratamiento con IECA
Empleo de estatinas
Iniciar vigilancia de la función renal

¿Hay alteraciones en la función renal y/o falla para controlar la tensión arterial?

No

Mantener en vigilancia la función renal:
Cada 6 meses por 5 años en esclerosis sistémica difusa

Diálisis temporal

¿Recuperación?

No

Valorar trasplante

Hipertensión arterial severa
(TA > 160/100 mm Hg)
Encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis, arritmia, edema pulmonar, retinopatía, proteinuria, anemia hemolítica microangiopática

A) Admisión en el hospital
B) Uso de IECA grado B
C) Uso de bloqueadores de canales de calcio o nitratos, losartan, alfametidopa
D) Empleo de estatinas
E) Realizar exámenes completos
F) Diagnóstico diferencial

¿Deterioro de la función renal?

No

Si

CRISIS RENAL ESCLERODERMIA

CMB,

A tener en cuenta:

- Requiere ingreso hospitalario, el objetivo de normalizar la Presión arterial en 72h.
- Los farmacos de eleccion son IECA, Antagonistas de de los canales de calcio , nitroprusiato por via intravenosa, diureticos o alfa-bloqueantes . Debe mantenerse de forma crónica.
- Se requiere tratamiento de sustitución renal en los casos de deterioro función renal
- El Trasplante renal es opción de tratamiento si se mantiene la Insuficiencia renal ,estadio IV con un filtrado glomerular menor a 30 ml/ min/1.73 m² por 18 meses.

BIBLIOGRAFIA

The logo for CMB (Colección Médica de Buenos Aires) is located in the top right corner. It consists of the letters 'CMB' in a bold, white, sans-serif font, with a small white comma-like mark below the 'B'. The logo is set against a dark blue square background.

- Alperi M. Manual SER Enfermedades reumáticas. 6ta edicion. Madrid, España. Elsevier. 2014.
- Cervera R. Enfermedades autoinmunes sistemicas, Diagnostico y tratamiento. 6ta edición. Barcelona, España. . Editorial medica Panamerica. 2020.
- Turrion A, Martin R, Sanchez A. Esclerodermia, Medicine. 2013;11(32):1981-90
- Chavez A, Moreno F. Protocolo diagnóstico y tratamiento de la afectaciónrenal en la esclerosis sistémica. Medicine. 2019;12(82):4857-9
- Denton C,Khanna D. Systemic sclerosis. The Lancet. 2017;390(10103), 1685–1699.
- Van den Hoogen F, Khanna D, Fransen J, et al2013 classification criteria for systemic sclerosis: an American college of rheumatology/European league against rheumatism collaborative initiativeAnnals of the Rheumatic Diseases 2013;72:1747-1755.
- .Cutolo M, Soldano S, Smith V. Pathophysiology of systemic sclerosis: current understanding and new insights. Expert Review of Clinical Immunology. 2019 May 13;15(7):753–64.
- .Aspe Unanue L, González Hermosa MR, Gardeazabal García J. Esclerodermia (esclerosis sistémica). Piel. 2010 May;25(5):252–66.
- Octubre 2008 • en Medicina [Internet]. [cited 2023 Aug 9]. Available from: http://clinicamedica1.com.uy/wp-content/uploads/2016/05/Esclerosis_sistemica.pdf

Gracias !!!!